

PROBABILITA' E STATISTICA

Prova del 29/07/2016

Traccia A

ESERCIZIO 1

Sulla distribuzione di valori presentata in tabella, calcolare:

- a) la media aritmetica, la media armonica e la media geometrica;
- b) la mediana e la moda.

X
9
0
7
1
7
3
2
<hr/> <hr/>
29

$$M(X) = \frac{29}{7} = 4,1429$$

Ma(X) = **impossibile**, perché una delle X è uguale a 0

Mg(X) = **nulla**, perché una delle X è uguale a 0

mediana = **3** (elemento nella posizione centrale della distribuzione ordinata dei valori)

moda = **7** (elemento con la frequenza più elevata)

ESERCIZIO 2

X	Y	X * Y	X ²	Y ²
5	29	145	25	841
9	25	225	81	625
12	20	240	144	400
13	18	234	169	324
39	92	844	419	2190

Sui dati presentati in tabella calcolare:

- i parametri della retta interpolante $Y'=a+bX$;
- il coefficiente di correlazione lineare, commentandolo brevemente;

a) Calcolo dei parametri della retta interpolante $Y'=a+bX$:

Calcolo attraverso le formule dirette (ma si poteva anche sviluppare il sistema):

$$b = \frac{\text{Cov}(X;Y)}{V(X)} \quad a = M(Y) - bM(X)$$

$$M(X) = \frac{39}{4} = \mathbf{9,75}$$

$$M(Y) = \frac{92}{4} = \mathbf{23}$$

$$\text{Cov}(X;Y) = M(X*Y) - M(X)*M(Y) = \frac{844}{4} - 9,75 * 23 = \mathbf{-13,2500}$$

$$V(X) = M(X^2) - M(X)^2 = \frac{419}{4} - 9,75^2 = \mathbf{9,6875}$$

$$b = \frac{\text{Cov}(X;Y)}{V(X)} = \frac{-13,25}{9,6875} = \mathbf{-1,3677}$$

$$a = M(Y) - bM(X) = 23 - (-1,3677) * 9,75 = \mathbf{36,3355}$$

b) Calcolo del coefficiente di correlazione lineare e suo breve commento:

$$r = \frac{\text{Cov}(X;Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}$$

$$V(Y) = \frac{2190}{4} - 23^2 = \mathbf{18,5000}$$

$$\sigma(Y) = \text{RADQ}(18,5) = \mathbf{4,3012}$$

$$\sigma(X) = \text{RADQ}(9,6875) = \mathbf{3,1125}$$

$$r = \frac{-13,25}{4,3012 * 3,1125} = \mathbf{-0,9897} \quad \text{Si registra una forte relazione lineare indiretta}$$

ESERCIZIO 3

Data una V.C. Normale con media 100 e deviazione standard pari a 20, calcolare:

- a) $P(X) > 120$
- b) $P(X) < 70$
- c) $80 < P(X) < 110$
- d) $P(X) > 90$

Effettuando la standardizzazione ed utilizzando le relative tavole:

- a) $P(X) > 120$

$$P(X > 120) = P(u > (120-100)/20) = P(u > 1) = 0,5 - 0,3413 = \mathbf{0,1587}$$

- b) $P(X) < 70$

$$P(X < 70) = P(u < (70-100)/20) = P(u < -1,5) = 0,5 - 0,4332 = \mathbf{0,0668}$$

- c) $80 < P(X) < 110$

$$P(80 < X < 110) = P((80-100)/20 < u < (110-100)/20) = P(-1 < u < 0,5) = 0,3413 + 0,1915 = \mathbf{0,5328}$$

- d) $P(X) > 90$

$$P(X > 90) = P(u > (90-100)/20) = P(u > -0,5) = 0,1915 + 0,5 = \mathbf{0,6915}$$

ESERCIZIO 4

Utilizzando la stessa variabile casuale proposta nell'esercizio 3, calcolare le medesime probabilità tramite R-Studio e disegnarne il grafico (si consiglia asse delle X da 0 a 200).

```
# CREO L'ASSE DELLE X
x=seq(0, 200, by = 0.01)

# CREO LA DISTRIBUZIONE NORMALE
normale=dnorm(x, 100, 20)

# CREO IL GRAFICO
plot(x, normale, type = "l", xlab="x", ylab = "densità di probabilità")

# A - CALCOLO P(X) > 120
pnorm(120, 100, 20, lower.tail=FALSE)

# B - CALCOLO P(X) < 70
pnorm(70, 100, 20)

# C - CALCOLO 80 < P(X) < 110
pnorm(110, 100, 20)-pnorm(80, 100, 20)

# D - CALCOLO P(X) > 90
pnorm(90, 100, 20, lower.tail=FALSE)
```

ESERCIZIO 5

Si ipotizzi di aver rilevato il n. di ore di straordinario mensili svolte da un gruppo di lavoratori italiani e da un corrispondente gruppo di colleghi indiani e che la varianza delle due popolazioni sia uguale. Il livello di confidenza sia pari al 95%. Verificare l'ipotesi che le medie siano uguali.

```
# GENERO IL VETTORE DEI DATI
straord.ita = c(10, 23, 12, 23, 11)
straord.ind = c(32, 20, 7, 19, 3)

# EFFETTUO IL TEST PER IL CONFRONTO FRA LE MEDIE DELLE DUE POPOLAZIONI
t.test(straord.ita, straord.ind, var.equal=TRUE, conf.level=0.95)

# POICHE' L'ALPHA TEORICO (OSSIA IL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA') E' 0.05 ED E' INFERIORE
AL p-value CALCOLATO DI 0.948, SI ACCETTA L'IPOTESI NULLA DI UGUAGLIANZA FRA LE
MEDIE
```

PROBABILITA' E STATISTICA

Prova del 29/07/2016

Traccia B

ESERCIZIO 1

Sulla distribuzione di valori presentata in tabella, calcolare:

- la media aritmetica, la media armonica e la media geometrica;
- la mediana e la moda.

X
5
2
0
10
9
4
2
<hr/> <hr/>
32

$$M(X) = \frac{32}{7} = 4,5714$$

Ma(X) = **impossibile**, perché una delle X è uguale a 0

Mg(X) = **nulla**, perché una delle X è uguale a 0

mediana = **4** (elemento nella posizione centrale della distribuzione ordinata dei valori)

moda = **2** (elemento con la frequenza più elevata)

ESERCIZIO 2

X	Y	X * Y	X ²	Y ²
2	5	10	4	25
6	16	96	36	256
8	20	160	64	400
11	25	275	121	625
27	66	541	225	1306

Sui dati presentati in tabella calcolare:

- i parametri della retta interpolante $Y'=a+bX$;
- il coefficiente di correlazione lineare, commentandolo brevemente;

a) Calcolo dei parametri della retta interpolante $Y'=a+bX$:

Calcolo attraverso le formule dirette (ma si poteva anche sviluppare il sistema):

$$b = \frac{\text{Cov}(X;Y)}{V(X)} \quad a = M(Y) - bM(X)$$

$$M(X) = \frac{27}{4} = \mathbf{6,75}$$

$$M(Y) = \frac{66}{4} = \mathbf{16,5}$$

$$\text{Cov}(X;Y) = M(X*Y) - M(X)*M(Y) = \frac{541}{4} - 6,75 * 16,5 = \mathbf{23,8750}$$

$$V(X) = M(X^2) - M(X)^2 = \frac{225}{4} - 6,75^2 = \mathbf{10,6875}$$

$$b = \frac{\text{Cov}(X;Y)}{V(X)} = \frac{23,875}{10,6875} = \mathbf{2,2339}$$

$$a = M(Y) - bM(X) = 16,5 - (2,2339) * 6,75 = \mathbf{1,4211}$$

b) Calcolo del coefficiente di correlazione lineare e suo breve commento:

$$r = \frac{\text{Cov}(X;Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}$$

$$V(Y) = \frac{1306}{4} - 16,5^2 = \mathbf{54,2500}$$

$$\sigma(Y) = \text{RADQ}(54,25) = \mathbf{7,3655}$$

$$\sigma(X) = \text{RADQ}(10,6875) = \mathbf{3,2692}$$

$$r = \frac{23,875}{7,3655 * 3,2692} = \mathbf{0,9915} \quad \text{Si registra una forte relazione lineare diretta}$$

ESERCIZIO 3

Data una V.C. Normale con media 90 e deviazione standard pari a 15, calcolare:

- a) $P(X) > 120$
- b) $P(X) < 75$
- c) $75 < P(X) < 105$
- d) $P(X) > 150$

Effettuando la standardizzazione ed utilizzando le relative tavole:

- a) $P(X) > 120$

$$P(X > 120) = P(u > (120-90)/15) = P(u > 2) = 0,5 - 0,4772 = \mathbf{0,0228}$$

- b) $P(X) < 75$

$$P(X < 75) = P(u < (75-90)/15) = P(u < -1) = 0,5 - 0,3413 = \mathbf{0,1587}$$

- c) $75 < P(X) < 105$

$$P(75 < X < 105) = P((75-90)/15 < u < (105-90)/15) = P(-1 < u < 1) = 0,3413 + 0,3413 = \mathbf{0,6826}$$

- d) $P(X) > 150$

$$P(X > 150) = P(u > (150-90)/15) = P(u > 4) = \mathbf{0} \quad (\text{si trova oltre il limite delle tavole})$$

ESERCIZIO 4

Utilizzando la stessa variabile casuale proposta nell'esercizio 3, calcolare le medesime probabilità tramite R-Studio e disegnarne il grafico (si consiglia asse delle X da 0 a 180).

```
# CREO L'ASSE DELLE X
x=seq(0, 180, by = 0.01)

# CREO LA DISTRIBUZIONE NORMALE
normale=dnorm(x, 90, 15)

# CREO IL GRAFICO
plot(x, normale, type = "l", xlab="x", ylab = "densità di probabilità")

# A - CALCOLO P(X) > 120
pnorm(120, 90, 15, lower.tail=FALSE)

# B - CALCOLO P(X) < 75
pnorm(75, 90, 15)

# C - CALCOLO 75 < P(X) < 105
pnorm(105, 90, 15)-pnorm(75, 90, 15)

# D - CALCOLO P(X) > 150
pnorm(150, 90, 15, lower.tail=FALSE)
```

ESERCIZIO 5

Si ipotizzi di aver rilevato il n. di ore di straordinario mensili svolte da un gruppo di lavoratori italiani e da un corrispondente gruppo di colleghi pakistani e che la varianza delle due popolazioni sia uguale. Il livello di confidenza sia pari al 95%. Verificare l'ipotesi che le medie siano uguali.

```
# GENERO IL VETTORE DEI DATI
straord.ita = c(20, 42, 24, 45, 24)
straord.pak = c(14, 26, 55, 50, 20)

# EFFETTUO IL TEST PER IL CONFRONTO FRA LE MEDIE DELLE DUE POPOLAZIONI
t.test(straord.ita, straord.pak, var.equal=TRUE, conf.level=0.95)

# POICHE' L'ALPHA TEORICO (OSSIA IL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA') E' 0.05 ED E' INFERIORE
AL p-value CALCOLATO DI 0.8421, SI ACCETTA L'IPOTESI NULLA DI UGUAGLIANZA FRA LE
MEDIE
```


PROBABILITA' E STATISTICA

Prova del 29/07/2016

Traccia C

ESERCIZIO 1

Sulla distribuzione di valori presentata in tabella, calcolare:

- la media aritmetica, la media armonica e la media geometrica;
- la mediana e la moda.

X
6
2
10
9
6
0
1
<hr/> <hr/>
34

$$M(X) = \frac{34}{7} = 4,8571$$

Ma(X) = **impossibile**, perché una delle X è uguale a 0

Mg(X) = **nulla**, perché una delle X è uguale a 0

mediana = **6** (elemento nella posizione centrale della distribuzione ordinata dei valori)

moda = **6** (elemento con la frequenza più elevata)

ESERCIZIO 2

X	Y	X * Y	X ²	Y ²
8	15	120	64	225
9	13	117	81	169
11	11	121	121	121
13	9	117	169	81
41	48	475	435	596

Sui dati presentati in tabella calcolare:

- i parametri della retta interpolante $Y'=a+bX$;
- il coefficiente di correlazione lineare, commentandolo brevemente;

a) Calcolo dei parametri della retta interpolante $Y'=a+bX$:

Calcolo attraverso le formule dirette (ma si poteva anche sviluppare il sistema):

$$b = \frac{\text{Cov}(X;Y)}{V(X)} \quad a = M(Y) - bM(X)$$

$$M(X) = \frac{41}{4} = 10,25$$

$$M(Y) = \frac{48}{4} = 12$$

$$\text{Cov}(X;Y) = M(X*Y) - M(X)*M(Y) = \frac{475}{4} - 10,25 * 12 = -4,2500$$

$$V(X) = M(X^2) - M(X)^2 = \frac{435}{4} - 10,25^2 = 3,6875$$

$$b = \frac{\text{Cov}(X;Y)}{V(X)} = \frac{-4,25}{3,6875} = -1,1525$$

$$a = M(Y) - bM(X) = 12 - (-1,1525) * 10,25 = 23,8136$$

b) Calcolo del coefficiente di correlazione lineare e suo breve commento:

$$r = \frac{\text{Cov}(X;Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}$$

$$V(Y) = \frac{596}{4} - 12^2 = \mathbf{5,0000}$$

$$\sigma(Y) = \text{RADQ}(5) = \mathbf{2,2361}$$

$$\sigma(X) = \text{RADQ}(3,6875) = \mathbf{1,9203}$$

$$r = \frac{-4,25}{2,2361 * 1,9203} = \mathbf{-0,9898} \quad \text{Si registra una forte relazione lineare indiretta}$$

ESERCIZIO 3

Data una V.C. Normale con media 120 e deviazione standard pari a 20, calcolare:

- a) $P(X) > 120$
- b) $P(X) < 80$
- c) $80 < P(X) < 140$
- d) $P(X) > 200$

Effettuando la standardizzazione ed utilizzando le relative tavole:

- a) $P(X) > 120$

$$P(X > 120) = P(u > (120-120)/20) = P(u > 0) = \mathbf{0,5}$$

- b) $P(X) < 80$

$$P(X < 80) = P(u < (80-120)/20) = P(u < -2) = 0,5 - 0,4772 = \mathbf{0,0228}$$

- c) $80 < P(X) < 140$

$$P(80 < X < 140) = P((80-120)/20 < u < (140-120)/20) = P(-2 < u < 1) = 0,4772 + 0,3413 = \mathbf{0,8185}$$

- d) $P(X) > 200$

$$P(X > 200) = P(u > (200-120)/20) = P(u > 4) = \mathbf{0} \quad (\text{si trova oltre il limite delle tavole})$$

ESERCIZIO 4

Utilizzando la stessa variabile casuale proposta nell'esercizio 3, calcolare le medesime probabilità tramite R-Studio e disegnarne il grafico (si consiglia asse delle X da 0 a 200).

```
# CREO L'ASSE DELLE X
x=seq(0, 240, by = 0.01)

# CREO LA DISTRIBUZIONE NORMALE
normale=dnorm(x, 120, 20)

# CREO IL GRAFICO
plot(x, normale, type = "l", xlab="x", ylab = "densità di probabilità")

# A - CALCOLO P(X) > 120
pnorm(120, 120, 20, lower.tail=FALSE)

# B - CALCOLO P(X) < 80
pnorm(80, 120, 20)

# C - CALCOLO 80 < P(X) < 140
pnorm(140, 120, 20)-pnorm(80, 120, 20)

# D - CALCOLO P(X) > 200
pnorm(200, 120, 20, lower.tail=FALSE)
```

ESERCIZIO 5

Si ipotizzi di aver rilevato il n. di ore di straordinario mensili svolte da un gruppo di lavoratori italiani e da un corrispondente gruppo di colleghi taiwanesi e che la varianza delle due popolazioni sia uguale. Il livello di confidenza sia pari al 95%. Verificare l'ipotesi che le medie siano uguali.

```
# GENERO IL VETTORE DEI DATI
straord.ita = c(13, 28, 16, 30, 16)
straord.tai = c(9, 17, 37, 33, 13)

# EFFETTUO IL TEST PER IL CONFRONTO FRA LE MEDIE DELLE DUE POPOLAZIONI
t.test(straord.ita, straord.tai, var.equal=TRUE, conf.level=0.95)

# POICHE' L'ALPHA TEORICO (OSSIA IL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA') E' 0.05 ED E' INFERIORE
AL p-value CALCOLATO DI 0.8597, SI ACCETTA L'IPOTESI NULLA DI UGUAGLIANZA FRA LE
MEDIE
```

PROBABILITA' E STATISTICA

Prova del 29/07/2016

Traccia D

ESERCIZIO 1

Sulla distribuzione di valori presentata in tabella, calcolare:

- la media aritmetica, la media armonica e la media geometrica;
- la mediana e la moda.

X
9
1
2
5
0
1
7
<hr/> <hr/>
25

$$M(X) = \frac{25}{7} = 3,5714$$

Ma(X) = **impossibile**, perché una delle X è uguale a 0

Mg(X) = **nulla**, perché una delle X è uguale a 0

mediana = **2** (elemento nella posizione centrale della distribuzione ordinata dei valori)

moda = **1** (elemento con la frequenza più elevata)

ESERCIZIO 2

X	Y	X * Y	X ²	Y ²
5	9	45	25	81
9	18	162	81	324
11	25	275	121	625
13	30	390	169	900
38	82	872	396	1930

Sui dati presentati in tabella calcolare:

- i parametri della retta interpolante $Y'=a+bX$;
- il coefficiente di correlazione lineare, commentandolo brevemente;

a) Calcolo dei parametri della retta interpolante $Y'=a+bX$:

Calcolo attraverso le formule dirette (ma si poteva anche sviluppare il sistema):

$$b = \frac{\text{Cov}(X;Y)}{V(X)} \quad a = M(Y) - bM(X)$$

$$M(X) = \frac{38}{4} = 9,5$$

$$M(Y) = \frac{82}{4} = 20,5$$

$$\text{Cov}(X;Y) = M(X*Y) - M(X)*M(Y) = \frac{872}{4} - 9,5 * 20,5 = 23,2500$$

$$V(X) = M(X^2) - M(X)^2 = \frac{396}{4} - 9,5^2 = 8,7500$$

$$b = \frac{\text{Cov}(X;Y)}{V(X)} = \frac{23,25}{8,75} = 2,6571$$

$$a = M(Y) - bM(X) = 20,5 - (2,6571) * 9,5 = -4,7429$$

b) Calcolo del coefficiente di correlazione lineare e suo breve commento:

$$r = \frac{\text{Cov}(X;Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}$$

$$V(Y) = \frac{1930}{4} - 20,5^2 = \mathbf{62,2500}$$

$$\sigma(Y) = \text{RADQ}(62,25) = \mathbf{7,8899}$$

$$\sigma(X) = \text{RADQ}(8,75) = \mathbf{2,9580}$$

$$r = \frac{23,25}{7,8899 * 2,958} = \mathbf{0,9962} \quad \text{Si registra una forte relazione lineare diretta}$$

ESERCIZIO 3

Data una V.C. Normale con media 110 e deviazione standard pari a 20, calcolare:

- a) $P(X) > 130$
- b) $P(X) < 90$
- c) $70 < P(X) < 110$
- d) $P(X) > 30$

Effettuando la standardizzazione ed utilizzando le relative tavole:

- a) $P(X) > 130$

$$P(X > 130) = P(u > (130-110)/20) = P(u > 1) = 0,5 - 0,3413 = \mathbf{0,1587}$$

- b) $P(X) < 90$

$$P(X < 90) = P(u < (90-110)/20) = P(u < -1) = 0,5 - 0,3413 = \mathbf{0,1587}$$

- c) $70 < P(X) < 110$

$$P(70 < X < 110) = P((70-110)/20 < u < (110-110)/20) = P(-2 < u < 0) = \mathbf{0,4772}$$

- d) $P(X) > 30$

$$P(X > 30) = P(u > (30-110)/20) = P(u > -4) = \mathbf{1} \quad (\text{si trova oltre il limite inferiore delle tavole})$$

ESERCIZIO 4

Utilizzando la stessa variabile casuale proposta nell'esercizio 3, calcolare le medesime probabilità tramite R-Studio e disegnarne il grafico (si consiglia asse delle X da 0 a 220).

```
# CREO L'ASSE DELLE X
x=seq(0, 220, by = 0.01)

# CREO LA DISTRIBUZIONE NORMALE
normale=dnorm(x, 110, 20)

# CREO IL GRAFICO
plot(x, normale, type = "l", xlab="x", ylab = "densità di probabilità")

# A - CALCOLO P(X) > 130
pnorm(130, 110, 20, lower.tail=FALSE)

# B - CALCOLO P(X) < 90
pnorm(90, 110, 20)

# C - CALCOLO 70 < P(X) < 110
pnorm(110, 110, 20)-pnorm(70, 110, 20)

# D - CALCOLO P(X) > 30
pnorm(30, 110, 20, lower.tail=FALSE)
```

ESERCIZIO 5

Si ipotizzi di aver rilevato il n. di ore di straordinario mensili svolte da un gruppo di lavoratori italiani e da un corrispondente gruppo di colleghi malesiani e che la varianza delle due popolazioni sia uguale. Il livello di confidenza sia pari al 95%. Verificare l'ipotesi che le medie siano uguali.

```
# GENERO IL VETTORE DEI DATI
straord.ita = c(50, 105, 60, 113, 60)
straord.mal = c(35, 65, 138, 125, 50)

# EFFETTUO IL TEST PER IL CONFRONTO FRA LE MEDIE DELLE DUE POPOLAZIONI
t.test(straord.ita, straord.mal, var.equal=TRUE, conf.level=0.95)

# POICHE' L'ALPHA TEORICO (OSSIA IL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA') E' 0.05 ED E' INFERIORE
AL p-value CALCOLATO DI 0.8426, SI ACCETTA L'IPOTESI NULLA DI UGUAGLIANZA FRA LE
MEDIE
```